

## INFORMATIONS CONCERNANT LA PRESCRIPTION DE COLCHICINE

### 1. Qu'est ce que la colchicine

La Colchicine provenait initialement d'un extrait de plantes (les colchiques), et est maintenant obtenue par synthèse chimique. Elle contient du saccharose et du lactose. Elle permet de diminuer l'inflammation dans le sang, et donc de réduire le risque d'évolution vers une amylose ou une dégradation de la fonction rénale.

### 2. Comment doit on l'administrer ?

Ce traitement se prend sous forme de comprimé une fois par jour. La dose habituelle varie de ½ cp (0,5 mg/j) à 1cp ½ (1,5 mg/j) selon l'âge.. Rarement ces doses peuvent être augmentées après avis spécialisé. Il ne faut pas interrompre le traitement.

### 3. Quels sont les effets secondaires ?

#### Réactions fréquentes

*Réactions digestives* : Diarrhée, nausées, vomissements. Ce sont les premiers signes d'un surdosage et vous devez en informer votre médecin.

#### Réactions rares ou très rares

*Manifestations cutanées* : urticaire, plaques rouges

*Manifestations hématologiques* : Baisse des globules blancs, des plaquettes, et plus rarement des globules rouges

*Manifestations musculaires* : douleurs musculaires

La plupart de ces manifestations régressent à l'arrêt du traitement.

En cas de rapports sexuels ou de grossesse, le traitement peut être poursuivi

### 4. Quelles précautions ?

**Le surdosage peut être mortel. Il est donc indispensable de mettre ce traitement hors de portée des jeunes enfants**

Les premiers signes d'intoxication à la colchicine se manifestent par une diarrhée aqueuse. Ces signes peuvent être initialement masqués lors d'un traitement par Colchimax<sup>R</sup> qui contient des dérivés opiacés.

**Certains médicaments ne doivent jamais être utilisés en même temps que la Colchicine :**

- les antibiotiques de la famille des macrolides peuvent entraîner un surdosage de colchicine et sont contre-indiqués en cas de traitement par Colchicine : josamycine (Josacine®), clarithromycine (Zeclar®) erythromycine, azithromycine (Zithromax®), roxithromycine (Rulid ®)... Si un macrolide est vraiment nécessaire, il faut choisir la spiramycine (Rovamycine®).
- La pristnamycine (Pyostacine®) est contre-indiquée
- Les antifongiques azolés (fluconazole (Triflucan ®)) sont déconseillés.

D'autres traitements nécessitent de précautions. Il convient donc d'informer systématiquement votre médecin que votre enfant prend ce traitement

Le traitement par Colchicine peut être poursuivi pendant la grossesse

Ce traitement doit être conservé à une température ne dépassant pas + 25 °C.

Médecin référent :

Mise à jour : Mars 2013

*ces données ne remplacent pas les le résumé de caractéristiques du produit établi par le laboratoire*